Применение масс-спектрометрии для анализа безопасности пищевых продуктов.

Владимир Капшуков.
Москва, октябрь 2007 г.

- Пищевые продукты и напитки
 - ⊕ Безопасность продуктов
 - Пестициды
 - Микотоксины
 - Остаточные количества вет.препаратов и др.
 - РАН
 - ⊕ Производство продуктов
 - Качество продуктов
 - Происхождение и аутентичность

- ВЭЖХ и UPLC
- Квадруполи (одиночные и тандемные)
- GC-MS/MS тандемные квадруполи
- GC MS высокого разрешения (TOF и магнитный сектор)
- TOF и Q-TOF
- Пробоподготовка (ТФЭ – Oasis)
- Специальное П/О для обработки данных в лаборатории

Законодательные акты о безопасности продуктов

- Безопасность пищевой продукции в Европе регулируется очень жестко
- Большое количество известных токсинов – диоксины, нитрофураны, запрещенные красители, консерванты.

— *Недавние пополнения:* никотин в яйцах, бензол в фруктовых напитках, вещества из упаковочных материалов

- Недостаточность публичной информации и уверенности в безопасности
- Очевидный конфликт между интересами производителя и потребителя.

Рост извещений о токсичности продуктов

Evolution of the number of notifications since 1999

Year	Alert	Information	Addition to alert	Addition to information	Total
2000	133	340	253	98	824
2001	302	406	549	310	1567
2002	434	1092	1032	466	3024
2003	454	1856	1098	878	4286
2004	692	1897	1449	1329	5367
2005	956	2202	2218	1521	6897
2005 increase (%)	+ 38.2%	+ 16.1%	+ 53.1%	+ 14.4%	+ 28.5%

- **Waters** является хорошо известным производителем в области безопасности пищевых продуктов.
 - Разработаны методы для большинства классов вредных веществ.
 - Поддерживается кооперация со многими ключевыми лабораториями и организация
- **Главные заказчики оборудования**
 - Правительственные агенства и министерства
 - Community Reference Laboratory, National Reference Laboratory, State Laboratory, Public Health Laboratory, Food Inspection Agency (Import / Export), Fisheries
 - Контрактные и исследовательские лаборатории
 - Производители пищевых продуктов и напитков

- Достоверность результатов
- Чувствительность
 - Для многих веществ допустимые пределы концентраций очень малы
- Скорость анализа, большое количество исследуемых компонентов в образце
- Сложная пробоподготовка
- Недостаток опытных операторов

Масс-спектрометрия – ключевой метод

Waters
THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

- ACQUITY + TQD
- ACQUITY UPLC + Xevo TQ

Почему масс-спектрометрия?

- Тандемный квадруполь
- Высокая чувствительность
- Надежная идентификация молекул по массе целой молекулы и ее фрагментам
- Высокая линейность (5 порядков величины) для количественного обсчета
- Селективность и меньшее влияние матрицы образца

- Пестициды
- Ветеринарные препараты
- Химические загрязнители (ПАУ)
- Диоксины
- Влияние упаковочных материалов
- Происхождение/аутентичность
- Природные токсины (микотоксины)

- VWA, Amsterdam, The Netherlands
 - 200 Pesticides on UPLC-QPXE
- KeyLab, Italy
 - 150 Pesticides on Alliance-Q Premier
- Service de Protection de la Consommation, Geneva, Switzerland
 - 250 compounds for routine screening and conformation on UPLC-Qmicro, two runs, 88 herbicides, 146 fungicides/insecticides
- Research institute for pesticides and water, Jaume, Spain
 - 53 Pesticides on HPLC- Qmicro
- CSL, York, UK
 - Pesticide Screening on UPLC-LCT
- Antwerpse Water Werken
 - Pesticides at trace level in drinking water

26 микотоксинов за 10 минут!

Rapid Multi-Mycotoxin Analysis using ACQUITY UPLC™ and Quattro Premier XE 72000xxxxEN

быстрый UPLC-MS/MS метод для
определения запрещенных
красителей в пищевых продуктах

- 20 sudan dyes за 10 минутный анализ

TNO Quality
of Life

Метод для определения 400 пестицидов (TQD и Xevo TQ)

- Высокая скорость сканирования – 10 000
- Минимальные dwell time – 20 мс
- Работа в паре с Acquity UPLC
- Простая пробоподготовка DisQuE (QUCHERS)

Все вместе позволяет с высокой достоверностью выполнить анализ 400 пестицидов за одну инъекцию.

Метод **QuEChERS** разработанный Anastassiades, Lehotay et al¹ at the USDA

- **Quick** – быстрый (один химик приготовит 10 GC/LC экстрактов менее чем за час)
- **Easy** - легкий (исключены многократные переносы пробы)
- **Cheap** - дешевый (даже с использованием криогенного измельчения - около €1)
- **Effective** – эффективный (дает хороший выход для широкого спектра пестицидов)
- **Rugged** – устойчивый (хорошо воспроизводится)
- **Safe** – безопасный (потребление растворителей сокращается более чем на 90%)

- Ref: ¹ Anastassiades, M., Lehotay, S.J., Stajnbaher, D., and Schenck, F., Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues in Produce (QuEChERS method); *J. AOAC Int.*, 86 (2003) 412-431.
- Further developments by Lehotay et al; *JAOAC Int.*, 88 (2005).

SAMPLE PREPARATION

Fruit & Vegetables Chopped & Frozen
Milled with Dry Ice

EXTRACTION/PARTITION

15 g Sample SHAKEN VIGOROUSLY for 1 minute by hand
with Acidified Acetonitrile, Salting Agent, Buffer & Internal standard
Centrifuge

CLEAN UP

Portion SHAKEN VIGOROUSLY for 20 seconds
with Drying Agent & PSA
Centrifuge

GC-MSMS

LC-MSMS

- ⊕ 50 мл туба для экстракции, содержащая 1.5 г ацетата натрия и 6 г сульфата магния;
- ⊕ 2-мл пробирка для очистки, содержащая 50 мг PSA (Primarily-Secondary Amine SPE Sorbent) и 150 мг безводного сульфата магния.

ПРОЦЕДУРА ПРОБОПОДГОТОВКИ.

- Добавьте 15 г гомогенизированного образца в тубу 1.
- Добавьте 15 мл раствора 1% уксусной кислоты в ацетонитриле.
- Добавьте внутренний пре-экстракционный стандарт.
- Взбалтывайте 1 минуту, а затем центрифугируйте в течении 1 минуты при 1500 об.
- Перенесите 1 мл экстракта в пробирку 2.
- Взбалтывайте 1 минуту, а затем центрифугируйте в течении 1 минуты при 1500 об.
- Перенесите 250 мкл в пробирку автоинжектора.
- Добавьте пост-экстракционный внутренний стандарт.
- Если необходимо, разведите.

Приготовленный таким образом образец анализируйте например методом Waters, позволяющим качественно и количественно определить до 400 пестицидов за одну инъекцию на уровне концентраций сотые доли пкг/мкл.

- PAHs occur in the food chain largely by two routes
 - PAHs are lipophilic and will bio-accumulate in adipose tissue
 - Processing such as smoking, grilling and smoke-drying can produce form PAHs in processed food
- Analysis of PAHs in foodstuffs has various challenges
 - Efficient separation of the target list compounds
 - Achieving required sensitivity for some compounds
 - Meeting legislative limits in complex food matrices
- **Waters Application Note 720001899EN**
 - **The use of tandem quadrupole GC/MS/MS for the determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in foodstuffs**

Традиционный GC/MS Analysis

- Ионизация электронным ударом PAHs обычно дает молекулярные ионы, практически без фрагментов.
- Идентификация затруднена
- Отклик слабый и может маскироваться материалом матрицы.
- The m/z 208 and 101 traces show potential interferences
- MS/MS фрагментируя молекулы ...
- Уменьшает влияние фона
- Производит специфичные и интенсивные фрагменты

TF1

160206023

160206023

160206023

160206023

- MRM traces show significant improvement
 - Better S/N
 - Clearer presence/absence of diagnostic ions
 - No interferences

Limits of Detection (LOD) Benzo[a]pyrene

IS: $^{13}\text{C}_4$ -Benzo[a]pyrene

SF2

160206021

160206021

160206021

- Копченый лосось с B[a]P at 0.04 mg/kg
- S/N значителен даже при такой концентрации
- Использованы 2 MRM (Quant + Conf)
- Пределы детекции на уровне ppt

**Smoked Salmon samples:
Benzo[a]pyrene**

- Высокая стабильность молекул PAHs делает затруднительной фрагментацию даже электронным ударом. Наличие удобных для идентификации ионов ограничено.
- Это делает затруднительным определение искомым аналитов, особенно в соответствии с директивой 2002/657/ЕС
- При использовании MS/MS, по крайней мере 2 характерных фрагмента получаются для каждого из аналитов .

Identification Criteria Benzo[g,h,i]perylene

- Data shown are for a cockle sample containing Benzo[g,h,i]perylene at 9.9 mg/kg
- Four transitions are monitored with good sensitivity
- Typically, at least 7 IPs could be obtained for each PAH

- This application demonstrates that GC-MS/MS offers significant advantages for PAHs analysis in food products compared to classical GC-MS approaches. Several benefits can be achieved including:
 - (1) Good sensitivity (down to ppt levels) in complex matrices using MRM
 - (2) Confident confirmatory analysis using multiple MRMs (up to 7 identification points per congener)

- Спасибо за внимание

- По всем вопросам обращаться в ООО «Химмед»
- 115230, г.Москва, Каширское шоссе, д.9, корп. 3
- Тел.: (495) 728-4192, 742-8265/66, (499) 613-2964,
Факс: (495) 742-8341
- **www.chimmed.ru**