



Утверждена
Главным ветеринарным
управлением Наркомзема СССР
8 июля 1944 года

ИНСТРУКЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ПЕРИПНЕВМОНИЕЙ (ПВЛ) КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

1. Борьба с перипневмонией (ПВЛ) крупного рогатого скота заключается:

- а) в предотвращении заноса перипневмонии в благополучные хозяйства СССР;
- б) в ликвидации болезни в пунктах (хозяйствах), где эта болезнь появилась.

В соответствии с указанными задачами должен проводиться комплекс следующих мероприятий.

1. Населенный пункт, колхоз, совхоз или часть хозяйства - ферма, гурт, в которых установлен хотя бы один случай заболевания крупного рогатого скота перипневмонией, признается неблагополучным и до уточнения эпизоотического состояния и степени распространения болезни ветврачом запрещаются ввод, вывод скота и перегруппировки его в самом хозяйстве.

2. Перипневмония (ПВЛ) крупного рогатого скота считается установленной в том случае, если клинический диагноз подтвержден обнаружением специфических для нее патологоанатомических изменений при вскрытии животных с подозрительными клиническими признаками болезни (независимо от стадии процесса). Для уточнения диагноза допускается диагностический убой одной-двух голов скота, составляются акт и подробный протокол вскрытия каждого убитого животного. В сомнительных случаях дополнительно рекомендуются: заражение телят, патологоанатомическое исследование и получение культур возбудителя.

3. О каждом установленном или подозрительном по перипневмонии заболевании крупного рогатого скота в благополучном до того хозяйстве ветврач или ветфельдшер, а при отсутствии последнего руководитель хозяйства немедленно извещает старшего ветврача райзо, который окончательно определяет болезнь согласно п. 2 и при наличии перипневмонии телеграфом уведомляет об этом ветеринарное управление области (края, республики), объявляет хозяйство неблагополучным и организует в нем необходимые мероприятия.

4. Основными мероприятиями являются:

а) представление исполкому райсовета депутатов трудящихся проекта решения о наложении карантина на неблагополучное хозяйство или на его отдельную самостоятельную часть;

б) поголовный точный учет взрослого рогатого скота и телят с занесением в ведомости и заполнение последних результатами произведенных дальнейших исследований и наблюдений (клинических, серологических, патологоанатомических, о прививках, реакциях на прививки и пр.);

в) порядковая нумерация животных и закрепление за ними стойл, пастбищ, водопоев, определенных рабочих бригад;

г) клиническое исследование на перипневмонию (перкуссия, аускультация и термометрия) всего взрослого крупного рогатого скота и телят в неблагополучном хозяйстве. Одновременно с этим берется кровь для направления в лабораторию с целью исследования по РСК;

д) распределение скота по группам в соответствии с результатами исследований;

е) убой на организуемой убойной площадке скота с клиническими признаками и подозрительного в заболевании перипневмонией, не дожидаясь исследований по РСК и независимо от результатов ее;

ж) организация клеймения карантинированного условно здорового (подозреваемого в заражении) скота.

5. Карантинированию подлежат колхозы, совхозы (или части их), которые имели тесное хозяйственное общение, и те группы скота, находящиеся в них, которые до обнаружения перипневмонии соприкасались с неблагополучными гуртами в помещениях, на пастбищах и водоемах, и которые на время карантина по хозяйственным соображениям не могут быть полностью разобщены.

6. В карантинированных хозяйствах запрещаются:

а) перегруппировки скота без ведома ветврача, проводящего оздоровительные мероприятия;

б) вывод скота из неблагополучного карантинированного хозяйства (пункта) и ввод в него здорового скота;

в) проезд на крупном рогатом скоте и прогон такового через карантинированную территорию хозяйства;

г) вывоз фуража из хозяйств и населенных пунктов, неблагополучных по повальному воспалению легких крупного рогатого скота. Фураж этих хозяйств и населенных пунктов используется только в тех же хозяйствах и пунктах.

7. От животных, сыворотки которых при первом исследовании в ветеринарной лаборатории окажутся сомнительными по РСК, вновь берется кровь и сыворотка подвергается вторичному исследованию. Животные с отрицательными реакциями признаются (условно) здоровыми; животные с положительными и дважды сомнительными реакциями относятся к числу больных.

8. Ветеринарные лаборатории обязаны известить хозяйство о результатах исследования сывороток по РСК не более чем в 3-дневный срок. Исследованию подлежат только вполне пригодные для этой цели сыворотки.

9. Все клинические больные, подозрительные по заболеванию перипневмонией и положительно реагирующие по РСК животные немедленно выделяются из стада в изолятор и подлежат убою на организованной в хозяйстве площадке, о чем составляется акт, а найденные патологоанатомические изменения подробно протоколируются. Кожи, снятые с убитых животных, подвергаются высушиванию на воздухе в изолированных условиях. Остывшее мясо используется в соответствии с "Правилами ветсанэкспертизы мяса". Забракованные пораженные органы и части туши при отсутствии утильустановок уничтожаются сжиганием или зарываются на скотомогильнике на глубину 2 м вместе с выделениями больных животных и загрязненным верхним слоем земли.

В исключительных случаях, при наличии большого количества подлежащего убою скота и полной невозможности организовать убойную площадку на месте, ветеринарный отдел области (края, республики) по своему усмотрению может допустить транспортировку такого скота по железной дороге или водным путем.

10. Помещения, в которых находился больной перипневмонией, подозрительный по заболеванию с положительной РСК скот, убойная площадка и территория вокруг нее, места осмотров и прививок скота подвергаются механической очистке и дезинфекции (10 - 20-процентным раствором хлорной или свежегашеной извести, 3-процентным раствором креолина, 2-процентным раствором лизола, 1-процентным раствором формалина, 3-процентным раствором карболовой кислоты, 2-процентным раствором едкого натра и калия, крепкими растворами зольного щелока и т.д.), навоз обеззараживается биотермически.

11. Животные, клинически и серологически признанные свободными от перипневмонии, но находившиеся в контакте с больным скотом до его изоляции, составляют условно здоровую (подозреваемую в заражении) группу скота, клеймятся на правой щеке буквой "П", и все, в том числе стельные и после отела коровы и телята от недельного возраста, подлежат вынужденным двукратным, с промежутком в 25 - 30 дней, прививкам перипневмонийными культурами согласно наставлению по проведению прививок.

12. В целях наиболее своевременного и полного удаления из неблагополучных хозяйств больных животных (инкубаторов и хроников), которые могут явиться источником распространения перипневмонии, несмотря на прививки, в хозяйствах до снятия карантина производятся клинические исследования скота не реже чем через две недели.

13. В хозяйстве (или части его) с условно здоровым скотом на весь срок карантина создаются условия, обеспечивающие его полную изоляцию от окружающих хозяйств или от остальных частей (ферм) хозяйства. За скотом закрепляют рабочих для обслуживания, усадебную территорию, скотные дворы, корма, пастбища, водопой, инвентарь по уходу и транспортные средства.

14. Карантин устанавливается на три месяца со времени окончания у всех животных реакции на вторую прививку перипневмонийной культуры. При обнаружении больных после второй прививки срок карантина исчисляется с момента удаления больных из стада.

Если в течение указанного срока не будут выявлены больные или подозрительные по перипневмонии животные, карантин снимается и хозяйство объявляется благополучным по перипневмонии.

15. В хозяйствах, граничащих с неблагополучными пунктами, как и в хозяйствах, в которых в предшествовавшем году была ликвидирована перипневмония, производится периодическое профилактическое, клиническое исследование (перкуссия, аускультация, термометрия) крупного рогатого скота. В случае обнаружения больных перипневмонией животных хозяйство снова карантинируется и в нем проводят мероприятия, изложенные выше.

16. В целях предупреждения заноса перипневмонии в благополучные пункты из местностей с энзоотическими очагами болезни перед отправлением на выпаса в эти местности благополучного крупного рогатого скота выясняются свободные от заражения районы, в которые и должен направляться скот, а по возвращении скота с выпасов обязательно производится клиническое его исследование. Из неблагополучных хозяйств и районов отгон скота не допускается.

17. Ветперсонал боен, мясокомбинатов, мясоконтрольных станций и ветеринарно-смотровых пунктов обязан уведомить ветеринарный отдел области или старшего ветврача райзо о случаях обнаружения перипневмонии у убитых животных с указанием хозяйств, из которых поступил скот.

18. При обнаружении перипневмонии в хозяйстве, находящемся в местности, благополучной по данному заболеванию, при условии малоценности и малочисленности в этом хозяйстве скота и значительном распространении среди него заболевания перипневмонией, по представлению ветеринарного отдела области (края, республики), обл(край)исполкомы и совнаркомы АССР выносят решения о полной ликвидации стада скота в неблагополучном хозяйстве путем убоя на мясо больных, подозрительных по заболеванию и условно здоровых (подозреваемых в заражении) животных. О решениях доводится до сведения Главного ветеринарного управления НКЗ СССР.

19. Ответственность за своевременность проведения административно-организационных мероприятий, за планомерное и полное проведение ветсанитарных требований и соблюдение карантинных правил возлагается на председателей колхозов, директоров совхозов, руководителей подсобных хозяйств, заведующих райземотделов и на старшего ветврача райзо. Независимо от принадлежности хозяйства к той или иной системе, ответственность за общее руководство борьбой с перипневмонией несут начальники ветеринарных отделов (управлений) обл(край)зо и наркомземов союзных республик.