

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата бипин

1 мл. препарата растворить в 2 л. воды и тщательно перемешать.

Использовать чистую водопроводную воду.

Эмульсию периодически перемешивать и использовать в течение рабочего дня. На следующий день не оставлять!

Доза: от 50 мл.- на слабые, до 150 мл.- на сильные ульи.

Обработку пчелиных семей проводят путем поливаания эмульсии бипина в межрамочные пространства по 10 мл. на улочку.

Можно использовать шприцы, мерные фляконы, дезирующие "насадки", шприцы-автоматы, распылитель "Росинка" не применять.

Обрабатывать весной и осенью

в период формирования клуба и отсутствия расплода, при температуре не ниже 0°C.

Гибель клещей наступает через полчаса и продолжается в течение 12 часов.

Клещеуловители не нужны.

Эффективность курса лечения после первичной обработки составляет 95-99%

БИПИН - профессиональный путь лечения варроатоза пчел

НПО "ЭЛТОС"
119296, г.Москва, Ленинский пр., д.69, офис 203
Тел./факс (495) 132-25-93
420100, г.Казань, ул. Х.Бигичева, д.3
Тел./факс: (843) 276-29-76,
276-29-86, 276-28-74, 276-28-73, 276-28-97